

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIONKI

Szczepionka DTaP (błonica, tężec, krztusiec): co należy wiedzieć

Many Vaccine Information Statements are available in Polish and other languages. See www.immunize.org/vis

Wiele informacji dotyczących szczepionek dostępnych jest w języku polskim lub w innych językach. Patrz www.immunize.org/vis

1 Dlaczego warto się szczepić?

Szczepionka DTaP może zapewnić dziecku ochronę przed błonicą, tężcem i krztuścem.

- **BŁONICA (D)** może powodować trudności z oddychaniem, paraliż i niewydolność serca. Przed wprowadzeniem szczepień każdego roku w Stanach Zjednoczonych błonica powodowała zgon dziesiątek tysięcy dzieci.
- **TEŻEC (T)** powoduje bolesne skurcze mięśni. Może spowodować „zablokowanie” szczęki, co uniemożliwi jej otwarcie lub przełykanie. Około 1 na 5 osób chorujących na tężec umiera.
- **KRZTUSIEC (aP)**, znany również jako koklusz, powoduje bardzo poważne ataki kaszlu, które uniemożliwiają niemowlętom lub dzieciom jedzenie, picie, a nawet oddychanie. Może wywoływać zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu oraz śmierć.

Większość dzieci szczepionych DTaP uzyska ochronę na cały okres dzieciństwa. Znacznie więcej dzieci zachoruje, jeśli zaprzestaniemy szczepień.

2 Szczepionka DTaP

Dzieci powinny zazwyczaj otrzymać 5 dawek szczepienia DTaP, jedną w każdym z poniższych wieków:

- 2 miesiące
- 4 miesiące
- 6 miesięcy
- 15-18 miesięcy
- 4-6 lat

DTaP może zostać podana jednocześnie z innymi szczepionkami. Czasami dziecko może otrzymać DTaP wraz z kilkoma innymi szczepieniami w formie pojedynczego zastrzyku.

3 Niektóre dzieci nie powinny otrzymać szczepienia DTaP lub powinny poczekać

DTaP jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci poniżej 7 roku życia. Szczepionka DTaP nie jest odpowiednia dla wszystkich osób – niektóre dzieci zamiast DTaP powinny otrzymać inne szczepienie, ukierunkowane wyłącznie przeciw błonicy i tężcowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli dziecko:

- Miało **reakcję alergiczną po poprzedniej dawce DTaP** lub cierpi na inne **poważne, zagrażające życiu alergie**.
- Było w **śpiączce lub cierpiało na długie, powtarzające się drgawki w ciągu 7 dni po otrzymaniu dawki DTaP**.
- Miało **drgawki lub inne problemy z układem nerwowym**.
- Cierpiało na schorzenie o nazwie **zespół Guillaina-Barrégo (GBS)**.
- Odczuwało **silny ból lub miało obrzęk po poprzedniej dawce szczepionki DTaP lub DT**.

W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o wstrzymaniu szczepienia DTaP do czasu kolejnej wizyty.

Dzieci przechodzące mniej poważne choroby, np. przeziębienie, mogą otrzymać szczepienie. Dzieci średnio lub poważnie chore powinny odczekać do czasu powrotu do zdrowia przed otrzymaniem szczepienia DTaP.

Lekarz może przekazać więcej informacji.



4 Ryzyko reakcji po szczepieniu

- Zaczerwienienie, ból, obrzęk i tkliwość w miejscu podania zastrzyku są powszechne po otrzymaniu DTaP.
- Gorączka, marudność, zmęczenie, spadek apetytu i wymioty mogą wystąpić do 3 dni po szczepieniu DTaP.
- Bardziej poważne reakcje, takie jak drgawki, nieprzerwany płacz przez ponad 3 godziny lub wysoka gorączka (powyżej 40,5°C), po podaniu DTaP występują znacznie rzadziej. W rzadkich przypadkach po podaniu szczepienia występuje obrzęk całego ramienia lub nogi, szczególnie u starszych dzieci, które otrzymały czwartą lub piątą dawkę.
- Długo utrzymujące się drgawki, śpiączka, utrata przytomności lub nieodwracalne uszkodzenie mózgu występują bardzo rzadko po podaniu szczepienia DTaP.

Podobnie jak w przypadku każdego leku, istnieje bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej, poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci po podaniu szczepionki.

5 Co robić w przypadku poważnego problemu?

Reakcja alergiczna może wystąpić po opuszczeniu przychodni przez dziecko. W przypadku zaobserwowania objawów poważnej reakcji alergicznej (pokrzywka, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, przyspieszone tętno, zawroty głowy lub osłabienie) należy zadzwonić pod numer 911 i przewieźć dziecko do najbliższego szpitala.

W przypadku innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem dziecka.

Poważne reakcje powinny zostać zgłoszone w systemie raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). Zazwyczaj raport składa lekarz, jednak można to zrobić samodzielnie. Należy odwiedzić stronę www.vaers.hhs.gov lub zadzwonić pod numer **1-800-822-7967**. *VAERS służy wyłącznie do zgłaszania działań niepożądanych, nie do uzyskiwania porad medycznych.*

6 Program odszkodowań dla osób poszkodowanych przez szczepienia

Program odszkodowań dla osób poszkodowanych przez szczepienia (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) jest programem rządowym stworzonym w celu zapewnienia odszkodowań osobom poszkodowanym przez określone szczepionki. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.hrsa.gov/vaccinecompensation lub kontaktu pod numerem **1-800-338-2382** w celu uzyskania informacji na temat programu i sposobu zgłaszania roszczeń. Zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie jest ograniczone czasowo.

7 Gdzie uzyskać więcej informacji?

- Zapytaj lekarza prowadzącego.
- Skontaktuj się telefonicznie z lokalnym lub stanowym wydziałem zdrowia.
- Skontaktuj się z Centrum Zwalczenia i Profilaktyki Chorób (Center for Disease Control and Prevention, CDC):
 - zadzwoń pod numer **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** lub
 - odwiedź stronę internetową www.cdc.gov/vaccines

Informacje dotyczące szczepionki (okresowe)

**Szczepionka DTaP
(błonica, tężec, krztusiec)**



Tylko do użytku urzędowego

08/24/2018 | 42 U.S.C. § 300aa-26