

婴儿和儿童(年龄 0-10 岁)疫苗接种

给孩子及时接种疫苗将有助于保护他或她免患 17 种疫苗可预防的疾病。
请询问您孩子的医务人员, 您的孩子是否已经及时接种了所有推荐的疫苗。

| 疫苗 | 您的孩子是否已经及时注射了疫苗? |
|-------------------------------------|---|
| 水痘 (水痘; Var) | 您的孩子需要注射 2 剂水痘疫苗。第一剂在出生 12-15 个月时注射, 第二剂在 4-6 岁时注射。 |
| 新冠肺炎 (COVID-19) | 根据目前 CDC 的建议, 年龄满 6 个月的儿童都需要接种新冠肺炎疫苗。该疫苗可预防儿童新冠肺炎引起的罕见但严重的并发症。 |
| 白喉、破伤风和百日咳 (百日咳; DTaP) | 您的孩子需要注射 5 剂 DTaP 疫苗。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射, 第四剂在 15-18 个月时注射, 第五剂在 4-6 岁时注射。 |
| 乙型流感嗜血杆菌 (Hib) | 您的孩子需要注射 3-4 剂 Hib 疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射(如果需要), 最后一剂在 12-15 个月时注射。 |
| 甲肝 (HepA) | 您的孩子需要注射 2 剂甲肝疫苗。第一剂在 1 岁时注射, 第二剂在之后的 6-18 个月时注射。 |
| 乙肝 (HepB) | 您的孩子至少需要注射 3 剂乙肝疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生时接种, 第二剂在 1-2 个月时接种, 最后一剂在 6-18 个月时接种。 |
| 人乳头瘤病毒 (HPV) | HPV 疫苗通常在儿童 11 或 12 岁时接种, 但也可提前至 9 岁时开始接种。该两剂系列应间隔 6-12 个月接种。 |
| 流感病毒 (流感) | 所有年满 6 个月的人都需要每年秋季或冬季接种流感病毒疫苗。一些年龄不足 9 岁的孩子需要注射 2 剂。如果您的孩子在这个季节需要接种 1 剂以上, 请咨询您孩子的医务人员。 |
| 麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR) | 您的孩子需要注射 2 剂 MMR 疫苗。第一剂在出生 12-15 个月时注射, 第二剂在 4-6 岁时注射。 |
| 脑膜炎球菌 (MenACWY、MenB) | 年龄为 0-10 岁且患有特定健康病症(比如无功能性脾脏)的婴儿和儿童需要接种 MenACWY 疫苗; 10 岁以上的儿童则需要接种 MenACWY 和 MenB 疫苗。与您的医务人员交谈, 弄清楚您的孩子是否需要接种脑膜炎球菌疫苗。 |
| 肺炎球菌 (结合疫苗 [PCV]; 多糖疫苗 [PPSV23]) | 您的孩子需要接种 4 剂结合疫苗 (PCV)。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射, 第四剂在 12-15 个月时注射。一些有某些健康状况的儿童还需要接种一剂多糖疫苗 (PPSV23)。请咨询您孩子的医务人员, 您的孩子是否需要接种这种额外的疫苗, 以预防肺炎球菌疾病。 |
| 小儿麻痹症 (IPV) | 您的孩子需要接种 4 剂脊髓灰质炎疫苗 (IPV), 以保护他们免受麻痹性脊髓灰质炎的影响。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6-18 个月时注射, 第四剂在 4-6 岁时注射。 |
| 轮状病毒 (RV) | 您的孩子需要注射 2-3 剂轮状病毒疫苗 (RV), 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂(如果需要)在 6 个月时注射。 |

您的孩子将去美国以外的地方旅游吗? 请访问美国疾病控制与预防中心 (CDC) 网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, 获取旅行信息, 或者咨询旅行诊所。

