

Вакцины для младенцев и детей в возрасте от 0 до 10 лет

Своевременная вакцинация Вашего ребенка поможет защитить его от 18 заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин. Узнайте у лечащего врача Вашего ребенка, сделаны ли все рекомендованные для его возраста вакцины.

Вакцина	Ваш ребенок полностью привит?
Ветряная оспа (ветрянка; Var)	Ваш ребенок должен получить 2 дозы вакцины против ветряной оспы. Первую дозу вводят в 12–15 месяцев, вторую дозу — в 4–6 лет.
COVID-19	Заболевание COVID-19 может привести к редким, но серьезным медицинским осложнениям у детей. Поговорите с лечащим врачом Вашего ребенка о его защите с помощью вакцинации.
Коклюш, дифтерия и столбняк (АКДС)	Вашему ребенку необходимо ввести 5 доз вакцины АКДС. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев, четвертую — в 15–18 месяцев, пятую — в 4–6 лет.
Гемофильная инфекция типа b (Hib)	Вашему ребенку необходимо 3–4 дозы вакцины Hib, в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев (если необходимо), последнюю — в 12–15 месяцев.
Гепатит А (Геп А)	Вашему ребенку необходимо ввести 2 дозы вакцины от гепатита А. Первую дозу вводят в возрасте 1 года, вторую дозу — спустя 6–18 месяцев.
Гепатит В (Геп В)	Вашему ребенку необходимо не менее 3 доз вакцины от гепатита В, в зависимости от марки вакцины. Первая доза вводится при рождении, вторая — в 1–2 месяца, последняя — в 6–18 месяцев.
Вирус папилломы человека (ВПЧ)	Вакцину против ВПЧ обычно вводят в возрасте 11–12 лет, однако ее можно вводить и с 9 лет. Интервал между введением двух доз должен составлять 6–12 месяцев.
Influenza (Грипп)	Всем людям от 6 месяцев и старше нужно получать вакцину против гриппа каждую осень или зиму. Некоторым детям младше 9 лет необходимо 2 дозы. Спросите лечащего врача Вашего ребенка, требуется ли Вашему ребенку больше 1 дозы в сезон.
Корь, паротит, краснуха (КПК)	Вашему ребенку необходимо 2 дозы вакцины КПК. Первую дозу вводят в 12–15 месяцев, вторую дозу — в 4–6 лет.
Менингококковые инфекции (MenACWY, MenB)	Младенцам и детям в возрасте 0–10 лет с определенными заболеваниями (например, если не функционирует селезенка) требуется вакцина MenACWY, а с 10 лет — вакцины MenACWY и MenB. Узнайте у Вашего лечащего врача о необходимости делать прививку против менингококковой инфекции.
Вакцина против пневмококковой инфекции (конъюгированная вакцина, [ПКВ]; полисахаридная вакцина, [PPSV23])	Вашему ребенку требуется 4 дозы конъюгированной вакцины (ПКВ). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев, четвертую — в 12–15 месяцев. Некоторым детям старшего возраста с определенными заболеваниями также требуется дополнительная вакцинация против пневмококковой инфекции. Узнайте у лечащего врача Вашего ребенка о необходимости дополнительной защиты от пневмококковой инфекции.
Полиомиелит (инактивированная полиомиелитная вакцина, ИПВ)	Вашему ребенку необходимо 4 дозы вакцины ИПВ, чтобы защитить его от паралитического полиомиелита. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6–18 месяцев, четвертую — в 4–6 лет.
Профилактическое антитело к респираторно-синцитиальному вирусу (мАТ к РСВ)	Младенцам в возрасте от рождения до 7 месяцев может потребоваться введение профилактического антитела к РСВ (мАТ к РСВ) до или во время их первого сезона РСВ, если вакцина против РСВ не вводилась во время беременности. Некоторым детям в возрасте от 8 до 19 месяцев, относящимся к группе высокого риска, может потребоваться введение мАТ к РСВ до второго сезона РСВ.
Ротавирус (РВ)	Вашему ребенку необходимо 2–3 дозы ротавирусной вакцины (РВ) в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев (если необходимо).

Ваш ребенок будет выезжать за пределы США? Посетите веб-сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list для получения информации о поездках или проконсультируйтесь в клинике туристической медицины.

