

# Vacunas para bebés y niños, edades de 0 a 10 años

*Vacunar al niño a tiempo le ayudará a protegerlo contra 18 enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Pregunte al proveedor de atención médica del niño si está al día con todas las vacunas recomendadas.*

| Vacuna                                                                                  | ¿El niño está al día?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varicela</b><br>(Var.)                                                               | El niño necesita 2 dosis de la vacuna contra la varicela. La primera dosis se administra entre los 12 y 15 meses, y la segunda entre los 4 y 6 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COVID-19</b>                                                                         | La enfermedad por COVID-19 puede provocar complicaciones médicas poco frecuentes, pero graves en los niños. Hable con el profesional de atención médica de su hijo sobre cómo protegerlo con la vacunación.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)</b>                                            | El niño necesita 5 dosis de la vacuna DTaP. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses, la cuarta entre los 15 y 18 meses y la quinta entre los 4 y 6 años.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Haemophilus influenza e tipo b (Hib)</b>                                             | El niño necesita de 3 a 4 dosis de la vacuna Hib, dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses (si es necesario) y la última entre los 12 y los 15 meses.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hepatitis A (HepA)</b>                                                               | El niño necesita 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A. La primera dosis se administra a la edad de 1 año y la segunda entre 6 y 18 meses después.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hepatitis B (HepB)</b>                                                               | El niño necesita, al menos, 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra al nacer, la segunda entre el primer mes y los 2 meses y la última dosis entre los 6 y 18 meses.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Virus del papiloma humano (VPH)</b>                                                  | La vacuna contra el VPH se administra a niños habitualmente a los 11 o 12 años de edad, pero puede comenzar desde los 9 años. Esta serie de dos dosis debe estar separada entre 6 y 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Influenza (Gripe)</b>                                                                | Todas las personas mayores de 6 meses de edad deben vacunarse contra la influenza cada año, en otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis. Pregunte al proveedor de atención médica de su hijo si el niño necesita más de 1 dosis esta temporada.                                                                                                                                                                               |
| <b>Sarampión, paperas, rubéola (MMR)</b>                                                | El niño necesita 2 dosis de la vacuna MMR. La primera dosis se administra entre los 12 y 15 meses, y la segunda entre los 4 y 6 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meningocócica (MenACWY, MenB)</b>                                                    | Los bebés y niños de 0 a 10 años de edad con ciertas afecciones médicas (como un bazo no funcional) necesitan la vacuna MenACWY o, a los 10 años de edad, las vacunas MenACWY y MenB. Hable con su proveedor de atención médica para averiguar si el niño necesita una vacuna meningocócica.                                                                                                                                                             |
| <b>Antineumococo (vacuna conjugada [PCV]; vacuna polisacárida [PPSV23])</b>             | El niño necesita 4 dosis de la vacuna conjugada (PCV). La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta entre los 12 y los 15 meses. Algunos niños mayores con determinadas afecciones médicas también necesitan vacunación adicional contra el neumococo. Pregunte al proveedor de atención médica del niño si el niño necesita esta protección adicional contra la enfermedad neumocócica. |
| <b>Poliomielitis (IPV)</b>                                                              | El niño necesita 4 dosis de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (inactivated polio vaccine, IPV) para protegerlo de la poliomielitis paralítica. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera entre los 6 y 18 meses y la cuarta entre los 4 y 6 años.                                                                                                                                                    |
| <b>Anticuerpo preventivo contra el virus sincicial respiratorio (mAb contra el VSR)</b> | Los bebés desde el nacimiento hasta los 7 meses de edad pueden necesitar anticuerpos preventivos contra el VSR (mAb contra el VSR) antes o durante su primera temporada de VSR si la vacuna contra el VSR no se administró durante el embarazo. Ciertos niños entre los 8 y 19 meses y que sean de alto riesgo pueden necesitar mAb contra el VSR antes de su segunda temporada de VSR.                                                                  |
| <b>Rotavirus (RV)</b>                                                                   | El niño necesita de 2 a 3 dosis de la vacuna contra el rotavirus (RV), dependiendo de la marca de la vacuna. La primera dosis se administra a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera (si es necesario) a los 6 meses.                                                                                                                                                                                                                        |

¿El niño viajará fuera de los Estados Unidos? Visite el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) usando el siguiente enlace: [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list), para obtener información con respecto a viajes, o consulte a una clínica para viajeros.

