

婴儿和儿童(年龄 0–10 岁)疫苗接种

给您的孩子及时接种疫苗将有助于保护他或她免患 18 种疫苗可预防的疾病。询问您孩子的医务人员, 您的孩子是否已经注射了所有截至目前为止推荐注射的疫苗。

疫苗	您孩子接种的疫苗符合当前的推荐吗?
水痘 (水痘; Var)	您的孩子需要注射 2 剂水痘疫苗。第一剂在 12–15 月龄时接种, 第二剂在 4–6 岁时接种。
2019 冠状病毒病 (COVID-19)	COVID-19 可能导致儿童出现罕见但严重的医学并发症。请与您孩子的医务人员讨论如何通过接种疫苗保护孩子。
白喉、破伤风和百日咳 (DTaP)	您的孩子需要注射 5 剂 DTaP 疫苗。第一剂在 2 月龄时注射, 第二剂在 4 月龄时注射, 第三剂在 6 月龄时注射, 第四剂在 15–18 月龄时注射, 第五剂在 4–6 岁时注射。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	您的孩子需要注射 3–4 剂 Hib 疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在 2 月龄时接种, 第二剂在 4 月龄时接种, 第三剂在 6 月龄时接种 (如有需要), 最后一剂在 12–15 月龄时接种。
甲型肝炎 (HepA)	您的孩子需要注射 2 剂甲型肝炎疫苗。第一剂在 1 岁时注射, 第二剂在之后的 6–18 个月后注射。
乙型肝炎 (HepB)	您的孩子至少需要注射 3 剂乙型肝炎疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生时接种, 第二剂在 1–2 个月时接种, 最后一剂在 6–18 个月时接种。
人乳头瘤病毒 (HPV)	HPV 疫苗通常在儿童 11 或 12 岁时接种, 但也可提前至 9 岁时开始接种。该两剂序列应间隔 6–12 个月接种。
流感 (流感)	所有年满 6 个月的人都需要每年秋季或冬季接种流感病毒疫苗。一些年龄不足 9 岁的孩子需要注射 2 剂。如果您的孩子在这个季节需要接种 1 剂以上, 请咨询您孩子的医务人员。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	您的孩子需要注射 2 剂 MMR 疫苗。第一剂在 12–15 月龄时接种, 第二剂在 4–6 岁时接种。
脑膜炎球菌 (MenACWY、 MenB)	年龄为 0–10 岁且患有特定病症 (比如脾脏无功能) 的婴儿和儿童需要接种 MenACWY 疫苗; 如果 10 岁的儿童, 则需要接种 MenACWY 和 MenB 疫苗。与您的医务人员交谈, 弄清楚您的孩子是否需要接种脑膜炎球菌疫苗。
肺炎球菌 (结合疫苗 [PCV]; 多糖 疫苗, [PPSV23])	您的孩子需要接种 4 剂结合疫苗 (PCV)。第一剂在 2 月龄时接种, 第二剂在 4 月龄时接种, 第三剂在 6 月龄时接种, 第四剂在 12–15 月龄时接种。一些患有某些疾病的年龄较大的儿童也需要额外的肺炎球菌疫苗接种。请咨询您孩子的医务人员, 您的孩子是否需要接种这种额外的疫苗, 以预防肺炎球菌疾病。
小儿麻痹症 (IPV)	您的孩子需要接种 4 剂脊髓灰质炎疫苗 (IPV), 以保护他们免受麻痹性脊髓灰质炎的影响。第一剂在 2 月龄时注射, 第二剂在 4 月龄时注射, 第三剂在 6–18 月龄时注射, 第四剂在 4–6 岁时注射。
呼吸道合胞病毒预防 性抗体 (RSV-mAb)	如果孕妇在怀孕期间没有接种 RSV 疫苗, 出生到 7 个月大的婴儿可能需要在其第一个 RSV 流行季开始前或流行季期间接受 RSV 预防性抗体 (RSV-mAb)。某些高风险的 8 至 19 月龄儿童在第二个 RSV 流行季之前需要接受 RSV-mAb。
轮状病毒 (RV)	您的孩子需要接种 2–3 剂轮状病毒疫苗 (RV), 接种次数依据疫苗品牌而定。第一剂在 2 月龄时注射, 第二剂在 4 月龄时注射, 第三剂 (如果需要) 在 6 月龄时注射。

您的孩子将去美国以外的地方旅游吗? 请访问美国疾病控制与预防中心 (CDC) 网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, 获取旅行信息, 或者咨询旅行诊所。

