

青春期前儿童和青少年的疫苗接种

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的事情。确保您的医务人员为您注射了截至目前为止应该注射的疫苗。检查以确保您接种了您需要的所有疫苗。

疫苗	您需要接种吗？
水痘 (水痘; Var)	也许。 如果您还没有接种该疫苗,且还没有患过水痘,那么您需要注射 2 剂疫苗。任何只接种了 1 剂疫苗的人应该注射第二剂。
新冠肺炎 (COVID-19)	是的! 即使您过去已患过新冠肺炎,您也需要接种疫苗。您现在需要接种的疫苗类型取决于最新的 CDC 建议。
甲肝 (HepA)	也许。 推荐所有 1-18 岁人群接种甲肝疫苗系列。如果您开始了一个接种系列,但没有完成,您可以从您没完成的剂次开始补种。
乙肝 (HepB)	也许。 建议所有 0-18 岁人群接种乙肝疫苗系列。如果您开始了一个接种系列,但没有完成,您可以从您没完成的剂次开始补种。
乙型流感嗜血杆菌(Hib)	也许。 如果您还没有接种过 Hib 疫苗,且患有某种高风险的病症(例如:无功能性脾脏),那么您需要接种该疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	是的! HPV 疫苗通常在青春期前儿童 11 岁或 12 岁时进行接种,但可提前至 9 岁时开始接种。未接种疫苗的年龄较大的青少年将需要接种 2 剂或 3 剂。这种疫苗可预防 HPV,而 HPV 是几种癌症的常见成因。
流感病毒 (流感)	是的! 为了保持健康和活跃,在您的一生中,每年秋天或冬天都需要接种流感病毒疫苗。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	也许。 如果您还没有接种过 MMR 疫苗,那么您需要注射 2 剂 MMR 疫苗。通常在儿童期接种 MMR 疫苗。
脑膜炎球菌 ACWY (MenACWY、MCV4)	是的! 所有青春期前的儿童和青少年都需要注射 2 剂 MenACWY 疫苗,第一剂在 11-12 岁时注射,第二剂在 16 岁时注射。如果您是一名集体住宿的大学新生,如果您从未注射过 MenACWY 疫苗或只在 16 岁前注射过该疫苗,那么您需要注射一剂 MenACWY。如果您有持续的高风险健康状况,您还需要接种加强剂。询问您的医务人员您是否有某种健康危险因素。
乙型脑膜炎球菌 (MenB)	是的! 想要预防乙型脑膜炎的青少年应该从 16 岁开始接受 2 剂 MenB 疫苗。具有某些健康风险状况(如无功能脾脏)的青少年也应接种疫苗,如果其风险持续存在,则需要接种加强剂。询问您的医务人员您是否有某种健康危险因素。
肺炎球菌	也许。 您是否有持续的健康不良状况?如果有,请向您的医务人员进行核实,以确定您需要注射一种肺炎球菌疫苗,还是两种肺炎球菌疫苗。
小儿麻痹症 (IPV)	也许。 如果您尚没有注射过脊髓灰质炎疫苗,您需要注射至少 3 剂脊髓灰质炎系列疫苗。通常在儿童期注射脊髓灰质炎疫苗。
破伤风、白喉和百日咳 (Tdap; Td)	是的! 所有青春期前的儿童和青少年(以及成年人!)都需要注射一剂 Tdap 疫苗(一种预防破伤风、白喉和百日咳的疫苗)。在注射一剂 Tdap 后,您需要每 10 年注射一剂 Tdap 或破伤风-白喉(Td)疫苗。如果您怀孕,您将需要在每次妊娠期间,最好是在妊娠晚期再次注射 Tdap。

您将去美国以外的地方旅游吗?请访问美国疾病控制与预防中心(CDC)网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, 获取旅行信息,或者咨询旅行诊所。

