

# ¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	VRS- AcM	DTaP/Tdap Difteria, tétanos y tosferina (tos convulsa)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	VPI Poliomielitis	PCV Conjugado neumocócico	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	COVID-19	Dengue	VPH Virus del papiloma humano	Men- ACWY		MenB	Gripe
														Meningococo			
al nacer	✓	✓ <sup>2</sup> (0-7 meses)															
2 meses	✓		✓	✓	✓	✓	✓										
4 meses	✓ <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓	✓										
6 meses	✓		✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓ <sup>1</sup>										✓
8 meses	(6-18 meses)				(6-18 meses)												(a partir de los 6 meses)
12 meses		✓ <sup>2</sup> (8-19 meses)		✓		✓		✓	✓	✓✓ (2 dosis administradas con 6 meses de diferencia de forma rutinaria de los 12 a los 23 meses de edad)							
15 meses			✓ <sup>3</sup> (15-18 meses)	(12-15 meses)		(12-15 meses)		(12-15 meses)	(12-15 meses)		✓ <sup>4</sup>						Una dosis cada otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele al proveedor de atención médica de su hijo si necesita más de 1 dosis.
18 meses											Se recomienda la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad						
19 a 23 meses																	
4 a 6 años			✓		✓			✓	✓								
7 a 10 años										También se recomienda la vacuna HepA (2 dosis) para niños y adolescentes que no hayan sido vacunados previamente							La vacuna contra la gripe se recomienda cada año para todas las personas a partir de los 6 meses de edad
11 a 12 años			✓ (Tdap)									✓✓✓ <sup>5</sup> La vacuna contra el dengue se recomienda para determinados niños	✓✓ <sup>6,7</sup>	✓			
13 a 15 años														✓			
16 a 18 años														✓	✓✓ 8,9,10		

- NOTAS**
- 1 Es posible que su hijo no necesite esta dosis dependiendo de la marca de vacuna que utilice su proveedor de atención médica.
  - 2 Los bebés cuya madre no recibió una vacuna contra el VRS durante el embarazo y que sean menores de 8 meses y 0 días deben recibir anticuerpos preventivos contra el VRS (VRS-AcM) antes o durante la temporada de VRS (normalmente de octubre a marzo). Ciertos niños de alto riesgo (de 8 a 19 meses) necesitarán VRS-AcM antes de su segunda temporada de VRS.
  - 3 Esta dosis de DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses de edad si han transcurrido 6 meses desde la dosis anterior.

- 4 Por lo general, los niños de 5 años o más solo necesitan una dosis. El número de dosis para niños de 6 meses a 4 años viene determinado por la marca de vacuna.
- 5 Se recomienda a los niños de 9 a 16 años que vivan en Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Virgenes de los EE. UU., Estados Federados de Micronesia, República de las Islas Marshall y la República de Palau, y que tengan infección previa por dengue confirmada en laboratorio que reciban una serie de 3 dosis de la vacuna contra el dengue.
- 6 La vacuna contra el VPH es de rutina a los 11 o 12 años, pero puede iniciarse a los 9 años.

- 7 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- 8 Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertas afecciones médicas.
- 9 Su hijo adolescente puede necesitar una dosis adicional dependiendo de la recomendación de su proveedor de atención médica.
- 10 Cuando se necesitan las vacunas MenACWY y MenB, se puede utilizar una vacuna combinada MenABCWY.

