

儿童和青少年何时需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙肝	DTaP/Tdap 白喉、破伤风、百日咳(咳嗽)	Hib 乙型流感嗜血杆菌	IPV Polio	PCV 肺炎球菌结合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、腮腺炎、风疹	水痘	HepA 甲肝	COVID-19	登革热	HPV 人乳头瘤病毒	Men-ACWY	MenB	流感	
													脑膜炎球菌			
出生时 (出生24小时内)	✓															
2个月	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
4个月	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓										
6个月	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									✓	
12个月	(6-18个月)		✓	(6-18个月)	✓		✓	✓	✓✓ (在12-23个月时常规给予2剂,间隔6个月) HepA疫苗(2剂)也被建议用于既往未接种的儿童和青少年	✓ ³ 建议为所有年龄6个月及以上的人接种COVID-19新冠病毒疫苗					✓ (6个月及以上)	
15个月		✓ ² (15-18个月)	✓ (12-15个月)		✓ (12-15个月)	✓ (12-15个月)										
18个月																
19-23个月																
4-6岁		✓		✓			✓	✓								
7-10岁																
11-12岁		✓(Tdap)									✓✓✓✓ ⁴ 建议为某些儿童接种登革热疫苗	✓✓✓ ^{5,6}	✓			
13-15岁																
16-18岁													✓	✓✓ ^{7,8}		

每年秋季或冬季,对所有年龄为6个月及以上的人接种1剂。有些年龄小于9岁的孩子需要接种2剂;请咨询您孩子的医务人员您的孩子是否需要接种超过1剂疫苗。

建议为每个年龄在6个月及以上的人每年接种流感疫苗

备注 1 您的孩子是否需要注射该剂疫苗,取决于您的医疗护理提供者使用的疫苗品牌。
2 如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有6个月,可以早至年龄为12个月时接种该剂DTaP。
3 接种数量取决于给予的疫苗品牌。

4 年龄为9至16岁,居住在波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国,且经实验室确认有既往登革热感染的儿童建议接种3剂系列的登革热疫苗。
5 HPV疫苗通常在11岁或12岁时接种,但可在9岁时开始接种。

6 患有特定医学病症的儿童需要接种第三剂。
7 健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定健康病症的青少年,也建议接种该剂疫苗。
8 根据您的医疗护理提供者的建议,您的青少年可能需要接种额外剂次。

