

متى يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التطعيمات؟

العمر	HepB التهاب الكبد الوبائي ب	RSV- mAb	DTaP/ Tdap الدفتيريا والتيثانوس والشاهوق (السعال الديكي)	Hib المستدمية النزلية من النوع b	IPV شلل الأطفال	PCV المكورات الرئوية المتقارن	RV الفيروسية العجلية	MMR الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية	الحماق الجدري المائي	(HepA) التهاب الكبد الوبائي أ	كوفيد-19	حمى الضنك	HPV فيروس الورم الحليمي البشري	-Men ACWY	(MenB)	الإنفلونزا
عند الولادة	✓	2 ✓ 7-0) شهور														
شهران	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 شهور	1 ✓		✓	✓	✓	✓	✓									
6 شهور	✓		✓	1 ✓	✓	✓	1 ✓									✓
8 شهور	18-6) شهرًا	2 ✓ 19-8) شهرًا			18-6) شهرًا											
12 شهرًا				✓		✓		✓	✓	✓						
15 شهرًا			3 ✓ 18-15) شهرًا	15-12) شهرًا		15-12) شهرًا		15-12) شهرًا	✓	✓						
18 شهرًا																
23-19 شهرًا																
4-6 سنوات			✓		✓			✓	✓							
7-10 سنوات																
11-12 سنة			(Tdap) ✓													
13-15 سنة																
16-18 سنة																

(6 شهور وأكبر)

جرعة واحدة كل خريف أو شتاء. يحتاج بعض الأطفال الأصغر من 9 سنوات إلى جرعتين؛ أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة.

يُوصى بلقاح الإنفلونزا كل عام لكل شخص عمره 6 شهور فأكثر

4 ✓
أسأل مقدم الرعاية الصحية المتابع لطفلك عن لقاح كوفيد-19

✓✓
(جرعتان يتم إعطاؤهما بفصل بينهما مدة 6 أشهر بشكل روتيني في عمر 12 إلى 23 شهرًا)
يُوصى أيضًا بإعطاء لقاح HepA (جرعتان) للأطفال والمراهقين الذين لم يسبق لهم الحصول على اللقاح

5 ✓✓✓
يُوصى بلقاح حمى الضنك لبعض الأطفال

7.6 ✓✓

10.9.8 ✓✓

7 سيحتاج الأطفال الذين عندهم حالات طبية مُعَيَّنة إلى جرعة ثالثة.

8 يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء. يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين عندهم حالات صحية مُعَيَّنة.

9 قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية المتابع له.

10 عند الحاجة إلى لقاحي MenACWY وMenB، يمكن استخدام توليفة لقاح MenABCWY.

6 لقاح HPV روتيني في سن 11 أو 12 عامًا، لكن يمكن أن يبدأ في سن 9 سنوات.

1 ملاحظات قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على الماركة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.

2 يجب أن يحصل الرضع الذين لم تحصل أمهاتهم على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي RSV أثناء الحمل والذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر

و0 يومًا على الأجسام المضادة الوقائية للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) قبل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو خلاله (عادةً من أكتوبر إلى مارس). سيحتاج بعض الأطفال المعرضين لخطر مرتفع (من عمر 8 إلى 19 شهرًا) إلى RSV-mAb قبل موسم RSV الثاني.

3 يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكرًا عند عمر 12 شهرًا إذا مضت 6

