

어린이와 십대 청소년은 언제 백신 접종을 받아야 합니까?

나이	HepB B형 간염	RSV- mAb	DTaP/Tdap 디프테리아, 파상풍, 백일해 (백일 기침)	Hib 해모필루스 인플루엔자 b형	IPV 소아마비	PCV 폐렴구균 결합	RV 로타바 이러스	MMR 홍역, 볼거리, 풍진	바리 셀라 수두	HepA A형 간염	코로나19	덴기열	HPV 인유두종 바이러스	Men- ACWY	MenB	인플루 엔자 독감			
														수막구균					
출생 시	✓	✓ ² (0~7개월)																	
2개월	✓		✓	✓	✓	✓	✓												
4개월	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓												
6개월	✓		✓	✓ ¹	✓ (6~18 개월)	✓	✓	✓ ¹				✓ ⁴ 자녀의 의료서비스 제공자에게 코로나19 백신에 대해 문의하십시오.					✓		
8개월	(6~18 개월)																		
12개월		✓ ² (8~19 개월)		✓		(12~15 개월)	✓	✓	✓	(12~15 개월)	(12~15 개월)		(생후 12~23 개월 기간에 6개월 간격을 두고 정기적으로 2회 용량 투여)						(6개월 이상) 각 1회, 가을 또는 겨울. 9세 미만 소아 중 일부 는 2회 접종이 필요할 수 있 으므로, 자녀가 2회 이상 접 종을 받아야 하는지 담당 의 료진에게 문의하십시오.
15개월			✓ ³ (15~18개월)	(12~15 개월)															
18개월																			
19~23개월																			
4~6세			✓		✓			✓	✓	이전에 백신 접종을 받지 않은 소아 및 청소년에게도 HepA 백신(2회 접종)이 권장됩니다.							6개월 이상인 모든 아이들에게 매년 인플루엔자 백신 접종 을 권장합니다.		
7~10세																			
11~12세			✓ (Tdap)									✓✓✓ ⁵ 덴기 백신은 특정 아동에게 권장됩니다.	✓✓✓ ^{6,7}	✓					
13~15세																			
16~18세															✓	✓✓ 8,9,10			

참고 1 귀 자녀는 담당 의료서비스 제공자가 사용하는 백신 브랜드에 따라 이 용량이 필요하지 않을 수 있습니다.

2 임신 중 어머니가 RSV 백신 접종을 받지 않았고 생후 8개월 0일 미만인 영아는 RSV 유행기 전 또는 유행 기간 중(일반적으로 10월~3월) RSV 예방적 항체(RSV-mAb)를 투여받아야 합니다. 특정 고위험 소아(생후 8~19개월)는 두 번째 RSV 유행기 전에 RSV-mAb를 투여받아야 합니다.

3 이전 접종 후 6개월이 지난 경우, 이르면 생후 12개월에 이 DTaP 백신을 접종할 수 있습니다.

4 5세 이상의 소아는 일반적으로 1회 용량만 필요합니다. 6개월에서 4세까지의 소아에 대한 접종 횟수는 백신 브랜드에 의해 결정됩니다.

5 푸에르토리코, 미국령 사모아, 미국령 버진아일랜드, 미크로네시아 연방, 마셜제도 및 팔라우 공화국에 거주하며 검사를 통해 당기열 감염력이 확인된 9~16세 소아에게는 당기열 백신 3회 접종이 권장됩니다.

6 HPV 백신은 보통 11세 또는 12세에 접종하지만 9세에 시작할 수 있습니다.

7 특정 질환이 있는 아동은 세 번째 용량을 투여해야 합니다.

8 이 백신은 건강한 청소년에게 접종할 수 있습니다. 또한 특정 건강 문제가 있는 청소년에게도 이 백신을 권장합니다.

9 담당 의료진의 권장에 따라 청소년 자녀에게 추가 접종이 필요할 수 있습니다.

10 MenACWY와 MenB 백신이 모두 필요한 경우, MenABCWY 혼합 백신을 사용할 수 있습니다.

