

Когда детям и подросткам необходимо делать прививки?

Возраст	Геп В Гепатит В	МАТ к PCB	АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина)/КДС (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) Дифтерия, столбняк, коклюш (судорожный кашель)	Hib Гемофильная инфекция типа b	ИПВ (Инактивированная полиомиелитная вакцина) Полиомиелит	ПКВ Пневмо-кокковая конъюгированная вакцина	РВ Ротавирус	КПК Корь, паротит, краснуха	Ветрянка Ветряная оспа	Геп А Гепатит А	COVID-19	Лихорадка Денге	ВПЧ Вирус папилломы человека	Men- ACWY	MenB	Influenza Грипп		
при рождении	✓	✓ ² (0–7 мес.)																
2 месяца	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
4 месяца	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓											
6 месяцев	✓ (6–18 мес.)		✓	✓ ¹	(6–18 мес.)	✓	✓ ¹				✓ ⁴ Спросите лечащего врача Вашего ребенка о вакцине против COVID-19					✓ (6 мес. и старше)		
8 месяцев																		
12 месяцев		✓ ² (8–19 мес.)		✓		✓		✓	✓	✓✓ (2 дозы обычно вводятся с интервалом в 6 месяцев в возрасте 12–23 месяцев) Вакцина против гепатита А (2 дозы) также рекомендуется для детей и подростков, которые ранее не прививались.						Одна доза каждую осень или зиму. Некоторым детям младше 9 лет может потребоваться 2 дозы. Спросите у лечащего врача Вашего ребенка, требуется ли ему больше 1 дозы.		
15 месяцев				✓ ³ (15–18 мес.)	(12–15 мес.)	(12–15 мес.)	(12–15 мес.)											
18 месяцев																		
19–23 месяца																		
4–6 лет			✓		✓			✓	✓								Прививку против гриппа рекомендуется делать каждый год, начиная с возраста 6 месяцев и старше.	
7–10 лет																		
11–12 лет			✓ (КДС)										✓✓✓ ⁵ Вакцину против лихорадки Денге рекомендуется делать определенной категории детей	✓✓✓ ^{6,7}	✓			
13–15 лет																		
16–18 лет														✓	✓✓ ^{8,9,10}			

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вашему ребенку может и не потребоваться эта доза, в зависимости от марки вакцины, которую использует Ваш лечащий врач.
- Младенцы, матери которых не проходили вакцинацию против РСВ во время беременности, и которые младше 8 месяцев 0 дней, должны получать профилактическое антитело к РСВ (МАТ к РСВ) до или во время сезона РСВ (как правило, с октября по март). Некоторым детям из группы высокого риска (в возрасте от 8 до 19 месяцев) потребуется введение МАТ к РСВ до второго сезона РСВ.
- Эта доза вакцины АКДС может вводиться уже в возрасте 12 месяцев, если с момента введения предыдущей дозы прошло 6 месяцев.

- Детям в возрасте 5 лет или старше обычно требуется только одна доза. Количество доз для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет определяется в зависимости от марки вакцины.
- Детям в возрасте от 9 до 16 лет, проживающим в Пуэрто-Рико, на Американском Самоа, Американских Виргинских островах, в Федеративных штатах Микронезии, Республике Маршалловых островов и Республике Палау, у которых ранее была лабораторно подтвержденная инфекция лихорадки Денге, рекомендуется пройти серию из 3 доз вакцины против лихорадки Денге.
- Вакцину против ВПЧ обычно вводят в возрасте 11 или 12 лет, однако ее можно вводить и с возраста 9 лет.

- Детям с определенными заболеваниями потребуется третья доза.
- Эту вакцину можно вводить здоровым подросткам. Ее также рекомендуют для подростков с определенными заболеваниями.
- В зависимости от рекомендации врача, Вашему ребенку-подростку может потребоваться дополнительная доза.
- Если необходимо ввести обе вакцины MenACWY и MenB, можно использовать комбинированную вакцину MenABCWY.

