

¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	mAb contra el VSR	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina (pertusis)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	IPV Polio	PCV Conjugado neumocócico	RV Rotavirus	MMR (triple) Sarampión, paperas, rubéola	Varicela Varicela	HepA Hepatitis A	COVID-19	Dengue	VPH Virus del papiloma humano	Men- ACWY Meningocócica	MenB Meningocócica	Influenza Gripe
Al nacer	✓	✓ ²														
2 meses	✓	(0–7 meses)	✓	✓	✓	✓	✓									
4 meses	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 meses	✓		✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									✓
8 meses	(6–18 meses)				(6–18 meses)											
12 meses		✓ ² (8–19 meses)		✓		✓		✓	✓	✓✓ (2 dosis administradas con 6 meses de separación, generalmente a la edad de 12–23 meses)	✓ ⁴					(6 meses o más)
15 meses			✓ ³	(12–15 meses)		(12–15 meses)		(12–15 meses)	(12–15 meses)							/
18 meses			(15–18 meses)													
19–23 meses																
4–6 años			✓		✓			✓	✓							
7–10 años																
11–12 años			✓ (Tdap)										✓✓✓ ⁵ La vacuna contra el dengue se recomienda para ciertos niños	✓✓ ^{6,7}	✓	Se recomienda administrar la vacuna de la influenza cada año a todas las personas mayores de 6 meses de edad
13–15 años																
16–18 años														✓	✓✓ 8,9,10	

Una dosis cada otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan dos dosis; pregúntele al pediatra si su hijo necesita más de una dosis.

- NOTAS**
- 1 Es posible que su hijo no necesite esta dosis, según la marca de la vacuna que use el proveedor de atención médica.
 - 2 Bebés cuyas madres no recibieron una vacuna contra el VSR durante el embarazo y que sean menores de 8 meses 0 días deben recibir anticuerpos preventivos contra el VSR (mAb contra el VSR) antes o durante la temporada de VSR (normalmente de octubre a marzo). Ciertos niños de alto riesgo (entre los 8 y 19 meses) necesitarán mAb contra el VSR antes de su segunda temporada de VSR.
 - 3 Esta dosis de la vacuna DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.

- 4 Los niños de 5 años o más por lo general solo necesitan una dosis. El número de las dosis para niños de 6 meses a 4 años está determinado por la marca de vacuna.
- 5 Se recomienda que los niños de 9 a 16 años que viven en Puerto Rico, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Estadounidenses, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos, y que han tenido una infección de dengue previa, confirmada por un laboratorio, reciban una serie de tres dosis de la vacuna contra el dengue.
- 6 La vacuna contra el VPH se administra de rutina a los 11 o 12 años de edad, pero puede comenzar desde los 9 años.

- 7 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- 8 Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertos problemas de salud.
- 9 Es posible que su hijo adolescente necesite una dosis adicional, según lo recomiende el proveedor de atención médica.
- 10 Cuando se necesitan ambas vacunas, MenACWY y MenB, una combinación de MenABCWY es una opción.

