

Khi nào thì trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cần chích ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	RSV- mAb	DTaP/Tdap Bạch hầu, uốn ván, ho gà	Hib Viêm màng não mô do <i>Haemophilus influenzae</i> tuýp b	IPV Bại liệt	PCV Liên hợp phế cầu khuẩn	RV Vi-rút rota	MMR Sởi, quai bị, rubella	Vari- cella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	COVID-19	Sốt xuất huyết	HPV Vi rút papilloma ở người	Men- ACWY Viêm màng não cầu khuẩn	MenB	Influenza Cúm
Mới sinh	✓	✓ ² (0-7 tháng)														
2 tháng	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 tháng	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 tháng	✓		✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									
8 tháng	(6-18 tháng)	✓ ² (8-19 tháng)			(6-18 tháng)											
12 tháng				✓		✓		✓	✓	✓✓ (2 liều được chích cách nhau 6 tháng thường ở 12-23 tháng tuổi)						
15 tháng			✓ ³ (15-18 tháng)	(12-15 tháng)		(12-15 tháng)		(12-15 tháng)	(12-15 tháng)							
18 tháng																
19-23 tháng																
4-6 tuổi			✓		✓			✓	✓	Vắc-xin HepA (2 liều) cũng được khuyến cáo cho trẻ em và thanh thiếu niên chưa được chích ngừa trước đó						
7-10 tuổi																
11-12 tuổi			✓ (Tdap)									✓✓✓ ⁵ Vắc-xin ngừa sốt xuất huyết được khuyến cáo cho một số trẻ em nhất định	✓✓✓ ^{6,7}	✓		
13-15 tuổi																
16-18 tuổi														✓	✓✓ 8,9,10	

- LƯU Ý**
- Tùy theo loại vắc-xin mà bác sĩ sử dụng, con của quý vị có thể không cần đến liều này.
 - Trẻ sơ sinh có mẹ không chích vắc-xin RSV trong thời kỳ mang thai và trẻ dưới 8 tháng tuổi 0 ngày nên được chích kháng thể phòng ngừa RSV (RSV-mAb) trước hoặc trong mùa RSV (thường là từ tháng 10 đến tháng 3). Một số trẻ em có nguy cơ cao (8 đến 19 tháng) sẽ cần RSV-mAb trước mùa RSV thứ hai của trẻ.
 - Liều DTaP này có thể được chích sớm khi trẻ được 12 tháng tuổi nếu liều vắc-xin trước được chích cách đây 6 tháng.

- Trẻ em từ 5 tuổi trở lên thường chỉ cần một liều. Số liều cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi được xác định bởi nhãn hiệu vắc-xin.
- Những trẻ từ 9 đến 16 tuổi sống tại Puerto Rico, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Marshall Islands, và Cộng hòa Palau, và đã nhiễm sốt xuất huyết được xác nhận bằng xét nghiệm trước đây được khuyến cáo chích liều trình 3 liều vắc-xin ngừa sốt xuất huyết.
- Vắc-xin HPV được chích thường quy ở tuổi 11 hoặc 12 nhưng có thể bắt đầu ở 9 tuổi.

- Trẻ em có một số tình trạng y tế nhất định sẽ phải chích liều thứ ba.
- Vắc-xin này có thể được chích cho thanh thiếu niên khỏe mạnh. Thanh thiếu niên đang có một số tình trạng sức khỏe nhất định cũng được khuyến cáo chích vắc-xin này.
- Tùy theo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, con quý vị ở tuổi thanh thiếu niên có thể cần chích liều bổ sung.
- Khi cả vắc-xin MenACWY và MenB đều cần thiết, có thể sử dụng vắc-xin kết hợp MenABCWY.

