

儿童和青少年何时需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙型肝炎	RSV- mAb	DTaP/Tdap 白喉、破伤风、 百日咳（鸡咳）	Hib 乙型流感嗜 血杆菌	IPV 小儿麻痹症	PCV 肺炎球菌结 合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、 腮腺炎、 风疹	水痘 水痘	HepA 甲型肝炎	2019 冠状 病毒病 (COVID-19)	登革热	HPV 人 乳头瘤病毒	Men- ACWY	MenB	流感 流感
出生时	✓	✓ ² (0-7 个月)												脑膜炎球菌		
2 个月	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 个月	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 个月	✓		✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									✓
8 个月	(6-18 个月)	✓ ² (8-19 个月)			(6-18 个月)											(6 个月及 以上)
12 个月				✓		✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓✓ (在 12-23 个 月时常规给予 2 剂， 间隔 6 个月)	✓ ⁴ 请您向孩子的 医务人员咨询 COVID-19 疫苗接种事宜					
15 个月			✓ ³ (15-18 个月)	(12-15 个月)												
18 个月																
19-23 个月										也建议 HepA 疫苗 (2 剂)						
4-6 岁			✓		✓			✓	✓	用于 既往未接种 的儿童 和青少年						建议为每个 年龄在 6 个月 及以上的人每 年接种流感 疫苗
7-10 岁																
11-12 岁			✓ (Tdap)									✓✓✓ ⁵ 建议为某些 儿童接种登 革热疫苗	✓✓ ^{6,7}	✓		
13-15 岁																
16-18 岁														✓	✓✓ ^{8,9,10}	

备注 1 您的孩子是否需要注射该剂疫苗，取决于您的医务人员使用的疫苗品牌。

2 母亲在妊娠期间未接种 RSV 疫苗且年龄小于 8 个月零天的婴儿应在 RSV 流行季节（通常为 10 月至次年 3 月）之前或期间接受 RSV 预防性抗体（RSV-mAb）。某些高风险儿童（8 至 19 个月）在第二个 RSV 流行季之前需要接受 RSV-mAb。

3 如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有 6 个月，最早可以在 12 个月时接种该剂 DTaP。

4 年龄为 5 岁或以上儿童通常只需要接种一剂。6 月龄至 4 岁儿童的接种次数由疫苗品牌决定。

5 年龄为 9 至 16 岁，居住在波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国，且经实验室确认有既往登革热感染的儿童建议接种 3 剂系列的登革热疫苗。

6 HPV 疫苗通常在 11 岁或 12 岁时接种，但也可在 9 岁时开始接种。

7 患有特定医学病症的儿童需要接种第三剂。

8 健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定病症的青少年，也建议接种该剂疫苗。

9 根据您的医务人员的建议，您的孩子可能需要接种额外剂次。

10 当需要同时接种 MenACWY 和 MenB 两种疫苗时，可以使用 MenABCWY 联合疫苗。

