

疫苗資訊聲明

呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗： 須知事項

Many Vaccine Information Statements are available in Traditional Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis

許多疫苗資訊聲明有繁體中文及其他語言版本。請見 www.immunize.org/vis

1. 為何要接種疫苗？

RSV 疫苗可預防呼吸道融合病毒 (respiratory syncytial virus, RSV) 引起的下呼吸道疾病。RSV 是一種常見的呼吸道病毒，通常會導致類似感冒的輕微症狀。

RSV 可使所有年齡的人生病，但對於嬰兒和老年人可能特別嚴重。

- RSV 是美國嬰兒最常見的住院原因。12 個月以下的嬰兒（尤其是未滿 6 個月的嬰兒）和早產兒，或患有慢性肺病或心臟病或免疫系統較弱的兒童，罹患 RSV 重病的風險較高。
- RSV 感染可能對特定成人造成危險。患上 RSV 重病風險最高的成人包括老年人，尤其是患有慢性心臟病或肺病、免疫系統較弱、某些其他慢性醫療病症者，或者住在療養院者。

RSV 透過直接接觸病毒傳播，例如當感染者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫接觸您的眼睛、鼻子或嘴巴時。它也可以透過觸摸帶有病毒的表面（如門把）然後觸摸臉部而傳播。

RSV 感染的症狀可能包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴。在極年幼的嬰兒中，RSV 的症狀也可能包括易怒（煩躁）、活動量減少或無呼吸（呼吸暫停超過 10 秒）。

大多數人會在一到兩週內康復，但 RSV 可能較嚴重，導致呼吸短促和氧氣濃度過低。RSV 可引起細支氣管炎（肺部小氣道發炎）和肺炎（肺部感染）。RSV 也可能導致其他醫療病況的惡化，例如氣喘、慢性阻塞性肺病（一種肺部慢性疾病，導致呼吸困難）或心臟衰竭（心臟無法將足夠血液和氧氣輸送至全身）。

發生 RSV 重症的嬰兒和老年人可能需要住院。有些甚至可能死亡。

2. RSV 疫苗

有兩種可保護嬰兒防範 RSV 的免疫接種選項：給予孕婦接種的母體疫苗，或給予嬰兒的預防性抗體。大多數嬰兒只需接受這兩項之一即可得到保護。

疾病控制和預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 建議孕婦在孕期第 32 週至第 36 週期間接種單一劑量 RSV 疫苗，以預防嬰兒在 6 個月大以前染上 RSV 疾病。美國大部分地方均建議在九月至來年一月期間接種此疫苗。然而，在某些地點（例如：領地、夏威夷、阿拉斯加和佛羅里達州的部分地區），接種疫苗的時間可能根據 RSV 在區域內的流行時間而有所不同。

CDC 建議年滿 75 歲的每個人和 60 至 74 歲 RSV 重病風險較高的成人接種單一劑量 RSV 疫苗。60 至 74 歲高風險成人包括患有慢性心臟病或肺病、免疫系統較弱或某些其他慢性醫療病症者，或者住在療養院者。

RSV 疫苗可與其他疫苗同時接種。



U.S. CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION

3. 與您的醫療人員討論

若準備接種疫苗者符合下列情形，請告知提供疫苗的醫療人員：

- 曾在接種上一劑 RSV 疫苗後發生過敏反應，或曾發生任何嚴重、危及生命的過敏

在某些情況下，醫療人員可能會決定將 RSV 疫苗延遲到之後的就診再接再種。

患有輕微疾病（例如感冒）的人士也許適直接種。患有中度或重度疾病的人士，通常應等到康復後再接再種 RSV 疫苗。

您的醫療人員可為您提供更多資訊。

4. 疫苗反應風險

- 接種 RSV 疫苗後，可能會發生注射部位疼痛、發紅和腫脹，疲倦（感覺疲累）、發燒、頭痛、噁心、腹瀉，以及肌肉或關節疼痛。

在某些老年人中，接種 RSV 疫苗後，曾通報發生嚴重神經疾病，包括格林-巴利症候群 (Guillain-Barré syndrome, GBS)。目前無法確認或排除 60 歲以上人士接種 RSV 疫苗後是否會增加 GBS 風險。

在接種 RSV 疫苗的孕婦中，曾通報發生早產和孕期高血壓，包括先兆子癇。目前尚不清楚這些事件是否由此疫苗引起。

在接受任何醫療程序（包括接種疫苗）後有時會出現暈厥。如果您感到眩暈、視力生變或出現耳鳴，請告訴醫療人員。

就像任何藥物一樣，疫苗也有很微小的機會造成嚴重過敏反應、其他嚴重傷害或死亡。

V-Safe 是一種安全性監測系統，可讓您與 CDC 分享您或您的受撫養人在接種 RSV 疫苗後的感受。您可以在 vsafe.cdc.gov 找到資訊並在 V-Safe 登記。

5. 如果出現嚴重問題，該怎麼辦？

過敏反應可能在接種疫苗的人士離開診所後發生。如果您觀察到嚴重過敏反應的徵象（蕁麻疹、臉部及喉嚨腫脹、呼吸困難、心跳加快、眩暈或虛弱），請撥打 9-1-1 並將患者送往最近的醫院。

如有其他徵象引起了您的顧慮，請致電您的醫療人員。

應將不良反應報告給疫苗不良事件通報系統 (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)。您的醫療人員通常會提交此報告，或者您也可以自己提交。請瀏覽 VAERS 網站 www.vaers.hhs.gov 或撥打 1-800-822-7967。VAERS 僅用於報告反應，而 VAERS 的工作人員不會提供醫療建議。

6. 如何獲取更詳細資訊？

- 請詢問您的醫療人員。
- 請致電當地或州衛生局。
- 請造訪美國食品藥物管理局 (U. S. Food and Drug Administration, FDA) 網站，以取得疫苗仿單和其他資訊，網址：www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
- 聯絡美國疾病控制和預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)：
 - 撥打 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 或
 - 請瀏覽 CDC 網站：www.cdc.gov/vaccines。

