

Many vaccine information statements are available in Pashto and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

د واکسين د معلوماتو اړوند ډيرې بيانونه په پښتو او نورو ژبو کې موجود دي. [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis) وگورئ.

# د روتا وایرس واکسين:

## هغه څه چې تاسو باید پرې پوه شئ

### 1. ولې واکسين وکړو؟

د روتا وایرس واکسين کولای شي چې د روتا وایرس له ناروغۍ څخه مخنيوي وکړي.

د روتا وایرس په عمومي ډول سره په کوچنیانو او ځوانو ماشومانو کې د شدید، او بلن نس ناستي لامل ګرځي. استفراغ او تبه هم په هغو ماشومانو کې چې په روتا وایرس باندې اخته دي معمول دي. ماشومان بنایي د خپل بدن اوبه ضایع کړي او په روغتون کې بستري کیدو ته اړتیا ولري او حتی ژوند له لاسه ورکړي.

### 2. د روتا وایرس واکسين

د روتا وایرس واکسين د ماشوم په خولې کې د قطرو اچولو پواسطه تطبیق کيږي. کوچنیان باید د روتا وایرس کارول کیدونکي برانډ په پام کې نیولو سره، د روتا وایرس 2 یا 3 دوزونه ترلاسه کړي.

- لومړی دوز باید د 15 اونپو له عمر څخه وړاندې تطبیق شي.
- وروستی دوز باید د 8 میاشتو په عمر کې تطبیق شي.

تقریباً ټول هغه کوچنیان چې د روتا وایرس واکسين ترلاسه کوي هغوی به د روتا وایرس له شدید نس ناستي څخه خوندي شي.

بل وایرس چې "porcine circovirus" نومیږي د روتا وایرس د واکسين په یو برانډ (Rotarix) کې پیدا کېدلې شي. دا وایرس خلک نه مصاب کوي، او د خونديتوب هېڅ کوم خطر شتون نلري.

د روتا وایرس واکسين بنایي لکه د نورو واکسينونو په څېر په ورته وخت کې ورکړل شي.

### 3. د خپل روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي سره خبره وکړئ

خپل چمتو کونکي ته ووايئ که چېرې د واکسين تطبیق کونکي کس:

- د روتا وایرس واکسين له مخکیني ډوز څخه وروسته یې یو الرژیکي غبرګون څرګند کړي وي، یا یې شدیدې، د ژوند ګواښونکي الرژي ګانې لرلې وي
- کمزوری معافیتي سیستم ولري

- د ترکیبي معافیت سیستم شدید کمښت (SCID) ولري
- د کولمو یو ډول بندیدل چې "intussusception" نومیږي ولري

په ځنو مواردو کې، ستاسو د ماشوم د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي بنایي پرېکړه وکړي چې د روتا وایرس واکسين تر راتلونکي لیدني پورې وځنډوي.

د کوچنیو ناروغیو لکه زکام لرونکي کوچنیان، بنایي واکسين شي. هغه کوچنیان چې لږ یا ډېر ناروغ وي باید په معمول ډول سره د روتا وایرس د واکسين له تطبیقولو څخه وړاندې د صحتمنده کیدو تر مودې پورې صبر وکړي.

ستاسو د ماشوم د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي تاسو ته لا ډېر مالومات درکولای شي.

### 4. د یو واکسين د غبرګون خطرونه

- بدخلي یا خفیف، مؤقتي نس ناستی یا استفراغ د روتا وایرس له واکسين څخه وروسته رامنځته کیدلې شي.

د کولمو ننوتل یو بل کې (Intussusception) د کولمو یو ډول بندیدل دي چې په روغتون کې یې درملنه ترسره کيږي او بنایي جراحی ته اړتیا ولري. دا په طبیعي ډول په متحده ایالاتو کې هر کال په ځنو کوچنیانو کې پېښیږي، او معمولاً د دې لپاره کوم پیژندل شوی دلیل شتون نلري. معمولاً د واکسين د لومړي یا دویم دوز څخه وروسته د یوې اونۍ دننه، د روتا وایرس د واکسين له امله د کولمو د بندیدو یو کوچنی خطر هم شتون لري. دا اضافي خطر د متحده ایالاتو له تقریباً 1 په 20,000 کوچنیانو کې د متحده ایالاتو تر 1 په 100,000 کوچنیانو کې چې د روتا وایرس واکسين ترلاسه کوي، اټکل کيږي. ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي تاسو ته لا ډېر مالومات درکولای شي.

له هر ډول درملو سره، د یو واکسين لپاره خورا لږې چانس شتون لري چې د شدید الرژیکي غبرګون، یا بل جدي زیان، یا مړینې لامل وګرځي.



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

## 5. که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري نو څه؟

د کولمو د بندیدو لپاره، له شدیدې ژړا سره د معدې د درد علائم وگورئ. په لومړیو کې، دا پېښې ښايي څو دقیقو پورې دوام وکړي او په یو ساعت کې څو ځلې لارې او راشي. کوچنیان ښايي خپلې پښې د سینې تر قفس پورې کش کړي. ستاسو کوچنی ښايي څو ځلې استفراغ وکړي یا په غایطه موادو کې وینه ولري، یا ښايي کمزوری یا بدخلق معلوم شي. دا نښې معمولاً د روتا وایرس د واکسین د لومړي یا دویم ډوز څخه وروسته د لومړي اونۍ پرمهال پېښېږي، مگر د واکسین تطبیق څخه وروسته هر وخت د هغه تمه ولری. که چېرې تاسو فکر کوئ چې ستاسو ماشوم د کولمو په بندیدو اخته شوی دی، سمدستي د روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ. که چېرې تاسو نه شی کولای چې د خپلې روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ، خپل کوچنی روغتون ته ورسوئ. هغو ته ووايست چې ستاسو ماشوم د روتا وایرس واکسین ترلاسه کړی ده.

وروسته لدې چې واکسین شوی کس کلینیک پرېږدي پدې صورت کې یو الرژیکي غبرگون رامنځته کیدلی شي. که چېرې تاسو د جدي الرژیکي غبرگون علایم (التهابونه، د مخ او ستوني پرسوب، تنفس کې ستونزه، د زړه چټک ضربان، پرکالتوب، یا کمزوري) وگورئ، له 1-1-9 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او اړونده کس تر ټولو نژدې روغتون ته ورسوئ.

د هغو نورو علائمو لپاره چې تاسو اندېښمن کوي، د خپلې روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

د نا مطلوبو غبرگونونو په اړه باید د واکسین د نامطلوبو پېښو د راپور ورکولو سیستم (VAERS) ته راپور ورکړل شي. ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي به دا راپور ثبت کړي، یا دا کار تاسو په خپله ترسره کولای شئ. د VAERS له وېب پاڼې څخه په [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) کې لیدنه وکړئ یا له 1-800-822-7967 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. VAERS یوازې د غبرگونونو د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکونکي غړي طبي مشوره نه ورکوي.

## 6. د واکسین د زیان د جبران ملي پروگرام

د واکسین د زیان د جبران ملي پروگرام (VICP) یو فدرال پروگرام دی چې هغو کسانو ته د جبران لپاره جوړ شوی دی چې د ټاکلو واکسینونو پواسطه زیانمن شوي وي. د واکسین د تطبیق له امله د ادعا شوي زیان یا مړینې په اړه ادعاوي د ثبت کولو لپاره د وخت محدودیت لري چې د دوه کلونو په اندازه دی. د VICP له وېب پاڼې څخه په [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) کې لیدنه وکړئ یا 1-800-338-2382 شمېرې سره اړیکه ونیسئ ترڅو د دې پروگرام او د ادعا د ثبتولو په اړه مالومات تر لاسه کړئ.

## 7. زه مالومات څنگه ترلاسه کولای شم؟

- د خپلې روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.
- له خپلې سیمه ایزې یا ایالتي روغتیايي څانګې سره اړیکه ونیسئ.
- د واکسین د بستي او لا ډېرو مالوماتو لپاره د خوارو او درملو د ادارې (FDA) له وېب پاڼې څخه په [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines) کې لیدنه وکړئ.
- د ناروغېو د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو (CDC) سره اړیکه ونیسئ:
- د 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) شمېرې سره اړیکه ونیسئ یا
- د CDC له وېب پاڼې څخه په [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines) کې لیدنه وکړئ.

