

د واکسينو د معلوماتو بيانیه

Many Vaccine Information Statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسين معلوماتو ډېرې بيانې په پښتو او نورو ژبو موجود دي. وگورئ. www.immunize.org/vis

د RSV (Respiratory Syncytial Virus) واکسين: هغه څه چې تاسو يې په اړه بايد پوه شئ

1. ولې بايد واکسين وکړو؟

د RSV واکسين کولی شي د تنفسي سنسيشيال وېروس (RSV) له امله پيدا کېدونکي د لاندینۍ تنفسي مجرا ناروغۍ مخه ونيسي. RSV يو عام تنفسي وېروس دی چې عموماً د خفيف، زکام ډوله علايمو لامل کېږي.

RSV د هر عمر خلکو کې د ناروغۍ لامل کېږي خو د تنکيو ماشومانو او د ډير عمر لويانو لپاره په ځانگړي توگه جدي کېدلی شي.

د RSV د متحده ايالاتو په تېخور ماشومانو کې په روغتون کې د بستر کېدو ترټولو عام لامل دی. تر 12 مياشتو پورې عمر لرونکي تېخور ماشومان (په ځانگړي توگه 6 مياشتني او کم عمر لرونکي) او هغه ماشومان چې بې مودې زېږېدلي، يا هغوی چې د سږو يا مژمن ناروغي يا د معافيت ضعيف سيستم لري، هغوی د RSV شديد ناروغۍ خطر سره مخ دي.

د RSV انتانات د ځينو لويانو لپاره خطرناک کېدلی شي. د RSV شديد ناروغۍ خطر سره مخ لويانو کې د ډير عمر لرونکي خلک، د مژمن طبي ناروغيو لکه د زړه يا سږو ناروغيو لرونکي، د معافيت ضعيف سيستمونو لرونکي، يا ځينې نور طبي ناروغيو لرونکي شامل دي، يا هغوی چې د رنځورپالنې کورونو يا د اوږدمهاله پاملرنې تاسيساتو کې اوسېږي.

د RSV وېروس سره د مستقيم لمس له لارې خپريږي، لکه د بل فرد د ټوخي يا پرنجي څاڅکي ستاسې سترگو، پزې يا خولې سره په تماس کې شي. دا د داسې سطحو لمس کولو له لارې هم خپريدای شي چې وېروس ورباندې موجود وي، لکه د دروازې لاستې، او بيا د خپلو لاسونو مينځلو څخه مخکې که تاسې خپل مخ لمس کړئ.

د RSV انتان علايمو کې د پزې بهيدل، په اشتها کې کموالی، ټوخی، پرنجی، تبه يا د سينې څرار شامليدای شي. په تېخور ماشومانو کې د RSV علايمو کې ناکراري (بدخويی)، د فعاليت کميدل، يا ساه بنديدنه (ساه اخيستلو کې د 10 ثانيو څخه ډير ځنډ) شامليدای شي.

ډيری خلک په يوه يا دوه اونيو کې شه کېږي، خو RSV شديد کېدلی شي، چې په پايله کې د ساه لنډۍ او د اکسيجن د سطحې د ټيټوالي سبب کېږي. RSV د برونکيولايټس (د سږو د هوا د کوچنيو لارو پروسوب) او د سينه بغل (د سږو عفونيت) لامل کېدلی شي. ځينې وختونه RSV د نورو روغتيايي ستونزو د لا خرابيدو لامل کېدلی شي لکه استما يا ساه لنډي، د سږو د بندښت مژمنه ناروغي (د سږو يوه مژمنه ناروغي ده چې له امله يې د ساه اخيستل سختيږي)، يا د زړه ناکامي (کله چې زړه نه شي کولی بدن ته کافي وينه او اکسيجن ورسوي).

د ډير عمر لويان او تېخور ماشومان چې د RSV څخه ډير ناروغيږي بايد په روغتون کې بستر کېدو ته اړتيا ولري. ځينې يې حتی مړه کېږي.

2. د RSV واکسين

د RSV پروراندې د تېخور ماشومانو د محافظت لپاره دوه انتخابونه شتون لري: د بلارې ښځې لپاره د مور واکسين او ماشوم ته ورکول کېدونکي وځايوي انتي باډيز. د ډيری کوچنيو ماشومانو د محافظت لپاره لدغو انتخابونو څخه يوازې يوه ته اړتيا ده.

CDC د 6 مياشتو څخه کم عمر لرونکي تېخور ماشومانو کې د RSV ناروغۍ د مخنيوي لپاره بلارېو ښځو ته د حمل 32 څخه تر 36 اونۍ پورې د RSV واکسين د يوه دوز سپارښتنه کوي. دا واکسين د امريکا متحده ايالاتو ډيری برخو کې د سپتمبر څخه تر جنوري پورې موده کې سپارښتنه کېږي. په هرصورت، په ځينو ځايونو کې (د بيلگې په توگه، سيمې، هاوايي، الاسکا، او د فلوريډا ځينې برخې)، د واکسيناسيون وخت د کال په هغه وخت کې توپير لرای شي کله چې RSV په سيمه کې خپريږي.

CDC د RSV واکسين د يو ځل دوز د 75 کالو يا زيات عمر د هر فرد لپاره او د 60 څخه تر 74 کلونو پورې د لويانو لپاره توصيه کوي چې د RSV ناروغۍ ډير خطر لري. د 60 څخه تر 74 کلونو پورې بالغان چې د ډير خطر سره مخ دي پدې کې هغه کسان شامل دي چې د زړه يا سږو اوږدمهاله ناروغۍ د معافيت کمزوري سيستم، يا ځينې نور اوږدمهاله طبي حالتونه لري، او هغه کسان چې د نرسنگ کورونو اوسيدونکي دي.

د RSV واکسين ښايي د نورو واکسينونو سره په ورته وخت کې ورکړل شي.

3. له خپل روغتياپال سره خبرې وکړئ

د واکسينو چمتو کوونکي ته خبر ورکړئ که چېرې واکسين کېدونکی شخص: د RSV واکسين د مخکيني دوز وروسته حساسيت درلودلی وي، يا کوم سخت، د ژوند گواښونکي حساسيت ولري

په ځينو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکی ښايي پريکړه وکړي چې د RSV واکسين تر راتلونکي ليدنې پورې وځنډوي.

د زکام په څېر د کوچنيو ناروغيو لرونکي خلک هم واکسين کېدای شي. هغه کسان چې په منځني ډول يا سخت ناروغه وي زياتره د RSV د واکسينو له ترلاسه کولو مخکې تر رغيډو پورې انتظار باسي.

ستاسو روغتياپال کولی شي په دې اړه تاسو ته ډېر معلومات درکړي.



U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

4. د واکسین عکس العمل خطر ونه

د واکسین د تزریق په ځای کې درد، سوروالی، او پرسوب، ستریا (د ستریا احساس کول)، تبه، سر درد، زړه بدی، نس ناستی، او د عضلاتو او جوړونو درد د RSV واکسین وروسته پېښېدلې شي.

شدیدې عصبي ستونزې، د Guillain-Barré syndrome (GBS) په ګډون، په کلینیکي ازموینو کې د RSV واکسین وروسته په لویانو کې راپور شوي دي. د 60 څخه تر 74 کلونو پورې بالغان چې د ډېر خطر سره مخ دي پدې کې هغه کسان شامل دي چې د زړه یا سږو اوږدمهاله ناروغی، د معافیت کمزوري سیستم، یا ځینې نور اوږدمهاله طبي حالتونه لري، او هغه کسان چې د نرسنګ کورونو اوسیدونکي دي.

د امیندواری پر مهال د هغه بلارو بڼو ترمنځ چې د RSV واکسین یې کړي د پرې - ایګلامیسیا پشمول د بې مودې زیږون او د حمل په جریان کې د وینې لوړ فشار پېښو راپور ورکړل شوی دی. دا خبره واضح نده چې آیا واکسین د دغه پېښو لامل و.

خلک ځینې وختونه د واکسینو په ګډون له ځینو روغتیايي کرنلارو وروسته بې هوشه کیږي. که په تاسو سرګرځیږي، یا مو په لیدو کې بدلون راغلی وي یا مو په غوږ کې زنگاری وي، په اړه یې خپل روغتیایال ته ووايست.

لکه د نورو درملو په څېر، واکسین هم په ډېر نادره توګه له سخت حساسیت، نورو جدي ټپونو، یا مړینې سبب ګرځېدای شي.

V-safe د خونديتوب څارنې یو سیستم دی چې تاسو ته اجازه درکوي ترڅو له CDC سره هغه څه شریک کړئ چې تاسو، یا ستاسو پورې تړلي، یو څوک یې د RSV واکسینو له ترلاسه کولو وروسته احساس کوي. تاسو په V-Safe کې په vsafe.cdc.gov کې معلومات موندلای شئ او نوم لیکنه کولی شئ.

5. څه به کیري که چیرې کومه جدي ستونزه شتون ولري؟

یو حساسیتي عکس العمل کېدای شي هغه مهال رامنځته شي چې کله واکسین شوی کس له کلینیک څخه ووځي. که تاسو د جدي غبرګون نښې لکه (ټپونه، د مخ او ستوني پرسوب، تنفسي ستونزې، د زړه چټک ضربان، ستریا، یا کمزوري) ولیدلې نو 1-800-9 شمېرې ته زنگ ووهئ او اړوند شخص تر ټولو نږدې روغتون ته انتقال کړئ.

د نورو هغو علائمو لپاره چې تاسو یې په اړه اندېښنه لرئ، خپل د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي ته زنگ ووهئ.

د منفي عکس العملونو په اړه باید د

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) د (واکسینو

ضرري پېښو د راپور سیستم) ته راپور ورکړل شي. ستاسو

روغتیایال زیاتره دا ډول راپورونه ثبتوي، یا تاسو خپله باید دا کار وکړئ. له

VAERS وېب سایټ څخه په دې پته لیدنه وکړئ www.vaers.hhs.gov

یا دې شمیرې 1-800-822-7967 ته زنگ ووهئ. VAERS یواځې د

عکس العملونو په اړه د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکوونکي

روغتیايي مشورې نه ورکوي.

6. څرنگه کولی شم نور معلومات لاسته راوړم؟

له خپل روغتیایال څخه پوښتنې وکړئ.

خپلې ځایي یا ایالتي روغتیايي څانګې ته زنگ ووهئ.

د واکسینو د کڅوړې او په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د خوړو

او درملو ادارې (FDA) اړوند دې وېب پاڼې

www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines ته ورشئ.

Centers for Disease Control and Prevention

(ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکز) (CDC) سره په اړیکه کې شئ:

- زنگ ووهئ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) یا

- د CDC وېب سایټ ته په www.cdc.gov/vaccines ورشئ.

