

ویکسین سے متعلق معلومات کا بیان

Many Vaccine Information Statements are available in Urdu and other languages. See www.immunize.org/vis

ٹیکے کی معلومات کے بہت سارے بیانات اردو اور دوسری زبانوں میں دستیاب ہیں۔ www.immunize.org/vis کریں ملاحظہ

میننگوکوکل ACWY ویکسین: آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

2. میننگوکوکل ACWY ویکسین

نوعمریوں کو میننگوکوکل ACWY ویکسین کی 2 خوراکیوں کی ضرورت ہوتی ہے:

- پہلی خوراک: 11 یا 12 سال کی عمر میں
- دوسری (بوسٹر) خوراک: 16 سال کی عمر میں

نوعمریوں کے لیے معمول کی ویکسینیشن کے علاوہ، میننگوکوکل ACWY ویکسین لوگوں کے مخصوص گروہوں کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے:

- جو لوگ سپروگروپ A، C، W، یا Y میننگوکوکل بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے خطرے میں ہیں
- ایچ آئی وی والے لوگ
- کوئی بھی جس کی تلی (طحال) خراب ہو گئی ہو یا نکال دی گئی ہو، بشمول سگل سیل کی بیماری والے لوگ
- کوئی بھی شخص جو مدافعتی نظام کی شاذ و نادر والی حالت میں ہے جسے "کمپلیمینٹ جزو کی کمی" کہا جاتا ہے
- ایسا کوئی شخص جو ایک قسم کی دوا لے رہا ہے جسے "کمپلیمینٹ انہیبیٹر" کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایکویلیزومیب (جسے "Soliris" بھی کہا جاتا ہے) یا ravulizumab (جسے "Ultomiris" بھی کہا جاتا ہے)
- وہ مائیکرو بائیولوجسٹ جو معمول کے مطابق نائسیرس مینجائٹس کے آنسولٹیس کے ساتھ کام کرتے ہیں
- کوئی بھی شخص جو دنیا کے کسی ایسے حصے کا سفر کرتا ہو یا اس میں رہتا ہو جہاں میننگوکوکل بیماری عام ہے، جیسے افریقہ کے کچھ حصے
- رہائشی ہالوں میں رہنے والے کالج کے نئے طلبا جنہیں میننگوکوکل ACWY ویکسین سے مکمل طور پر ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے
- امریکی فوج کے رنڈروٹ

1. ویکسین کیوں لگوائیں؟

میننگوکوکل ACWY ویکسین سپرو گروپس A، C، W، اور Y کی وجہ سے ہونے والی میننگوکوکل بیماری کے خلاف حفاظت میں مدد کر سکتی ہے۔ ایک مختلف میننگوکوکل ویکسین دستیاب ہے جو سپرو گروپ B کے خلاف حفاظت میں مدد کر سکتی ہے۔

میننگوکوکل بیماری مینجائٹس (دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے استر کا انفیکشن) اور خون کے انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کا علاج کیا جاتا ہے، میننگوکوکل بیماری 100 میں سے 10 سے 15 متاثرہ افراد کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ زندہ رہتے ہیں، ان میں سے ہر 100 میں سے تقریباً 10 سے 20 معذوری کا شکار ہوں گے جیسے کہ سماعت کی کمی، دماغی نقصان، گردے کا نقصان، اعضاء کا نقصان، اعصابی نظام کے مسائل، یا جلد کے پیوندوں سے شدید داغ۔

میننگوکوکل بیماری شاذ و نادر ہے اور 1990 کی دہائی سے ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس میں کمی آئی ہے۔ تاہم، یہ ایک شدید بیماری ہے جس میں ان لوگوں میں موت یا دیرپا معذوری کا خطرہ ہوتا ہے جنہیں یہ لاحق ہوتی ہے۔

میننگوکوکل بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس میں درج ذیل شامل ہیں:

- ایک سال سے کم عمر کے بچے
- 16 سے 23 سال کی عمر کے نوعمر اور نوجوان بالغان
- بعض ایسے دائمی امراض جو مدافعتی نظام کو متاثر کرتے ہیں والے لوگ
- مائیکرو بائیولوجسٹ جو معمول کے مطابق نائسیریا مینجائٹس آنسولٹیس (*N. meningitidis*) کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بیکٹیریا جو میننگوکوکل بیماری کا سبب بنتا ہے
- وہ لوگ جو اپنے علاقے میں بیماری پھیلنے کی وجہ سے خطرے میں ہیں



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

3. اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں

اپنے ویکسین فراہم کنندہ کو بتائیں اگر جو شخص ویکسین لے رہا ہے اسے:

• میننگوکوکل ACWY ویکسین کی پچھلی خوراک کے بعد، الرجی زا ردعمل ہوا ہو، یا کوئی شدید، جان لیوا الرجیاں ہوں

کچھ معاملات میں، آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ مستقبل کی کسی ملاقات تک میننگوکوکل ACWY ویکسینیشن کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کے لیے اس ویکسین کے خطرات کے بارے میں معلومات محدود ہیں، لیکن کسی بھی حفاظتی خدشات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون کے لیے اگر ضروری قرار دیا جائے تو اسے ٹیکہ لگانا چاہیے۔

نزلے جیسی معمولی بیماریوں میں مبتلا افراد کو، ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ تھوڑے بہت یا شدید بیمار ہیں انہیں عام طور پر میننگوکوکل ACWY ویکسین لگوانے سے پہلے صحت یاب ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔

آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے۔

4. ویکسین کے ردعمل کے خطرات

• میننگوکوکل ACWY ویکسینیشن کے بعد جہاں ٹیکہ لگا ہے وہاں لالی یا درد ہو سکتا ہے۔

• میننگوکوکل ACWY ویکسین حاصل کرنے والے لوگوں کی ایک چھوٹی سی شرح فیصد کو پٹھوں میں درد، سر درد، یا تھکاوٹ کا تجربہ ہوتا ہے۔

لوگ بعض اوقات طبی طریقہ کار، بشمول ویکسینیشن کے بعد بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آ رہا ہے یا آپ کی بصارت میں تبدیلی آئی ہو یا کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہوں تو اپنے فراہم کنندہ کو بتائیں۔

کسی بھی دوا کی طرح، ویکسین کے شدید الرجی زا ردعمل، دیگر سنگین چوٹ، یا موت کا باعث بننے کا بہت کم امکان ہوتا ہے۔

5. اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو تو کیا ہو گا؟

ویکسین شدہ شخص کے کلینک سے نکلنے کے بعد الرجی زا ردعمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شدید الرجی زا ردعمل کی علامات نظر آئیں (چھپاکی، چہرے اور گلے میں سوجن، سانس لینے میں

دشواری، دل کی تیز دھڑکن، چکر آنا، یا کمزوری)، تو 1-1-9 کو کال کریں اور اس شخص کو قریبی ہسپتال لے جائیں۔

دیگر ایسی علامات کے لیے، جو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہوں، اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو کال کریں۔

ویکسین کے ناموافق واقعہ کے رپورٹنگ سسٹم (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) کو منفی ردعمل کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ عام طور پر یہ رپورٹ درج کرائے گا، یا آپ خود بھی کرا سکتے ہیں۔ VAERS ویب سائٹ www.vaers.hhs.gov ملاحظہ کریں یا 1-800-822-7967 پر کال کریں۔ VAERS صرف ردعمل کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اور VAERS کے عملے کے اراکین طبی مشورہ نہیں دیتے ہیں۔

6. نیشنل ویکسین انجری کمپنیشن پروگرام

نیشنل ویکسین انجری کمپنیشن پروگرام (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) ایک وفاقی پروگرام ہے جو ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جنہیں کچھ ویکسینوں سے ضرر پہنچا تھا۔ ویکسینیشن کی وجہ سے مبینہ چوٹ یا موت کے حوالے سے دعوے دائر کرنے کے لیے ایک وقت کی حد ہے، جو دو سال تک مختصر ہو سکتی ہے۔ پروگرام کے بارے میں جاننے اور دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں VICP کی ویب سائٹ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ملاحظہ فرمائیں یا 1-800-338-2382 پر کال کریں۔

7. میں مزید کیسے جان سکتا ہوں؟

• اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے پوچھیں۔
• اپنے مقامی یا ریاستی محکمہ صحت کو کال کریں۔
• ویکسین پیکیج کی پرچی اور اضافی معلومات کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (Food and Drug Administration, FDA) کی ویب سائٹ یہاں ملاحظہ کریں www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
• بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) سے رابطہ کریں:
- کال کریں 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) پر یا
- CDC کی ویب سائٹ www.cdc.gov/vaccines ملاحظہ کریں۔

Urdu translation provided by Immunize.org

Vaccine Information Statement
Meningococcal ACWY Vaccine

42 U.S.C. § 300aa-26
8/6/2021

OFFICE
USE
ONLY

