

ویکسین سے متعلق معلومات کا بیان

Many vaccine information statements are available in Urdu and other languages. See www.immunize.org/vis

ویکسین سے متعلق بہت سے معلوماتی بیانات اردو اور دیگر زبانوں میں دستیاب ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں www.immunize.org/vis

نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین: آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے

- 19 تا 49 سال کی عمر کے بالغ افراد جنہیں PCV نہ دی گئی بو اور جن کے پاس کچھ خاص طبی حالتوں یا دیگر خطرے والے عوامل ہوں، انہیں PCV لینی چاہیے۔ اس گروپ کے بعض افراد جنہیں پہلے ہی PCV دی جاچکی ہے انہیں مزید ایک خوراک لینے کی تجویز کی جاسکتی ہے۔
- 50 یا اس سے زیادہ عمر کے افراد جنہیں پہلے کبھی PCV نہ دی گئی بو، انہیں PCV لینی چاہیے۔ اس گروپ کے بعض افراد جنہیں پہلے ہی PCV دی جاچکی ہے انہیں مزید ایک خوراک لینے کی تجویز کی جاسکتی ہے۔

3. اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں۔

- اپنے ویکسین فراہم کنندہ کو بتائیں اگر ویکسین لینے والے فرد کو:
- پہلے کسی بھی قسم کی نیوموکوکل ویکسین (PCV) کی خوراک کے بعد الرجی زا ردعمل ہوا ہو، یا کسی ایسی ویکسین سے الرجی ہو جس میں ڈفتھیریا ٹاکسائٹ شامل ہو (مثال کے طور پر DTaP)، یا جسے کسی شدید اور جان یوا قسم کی الرجی ہو
- کچھ معاملات میں، آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ مستقبل کے دورے تک PCV ملتوي کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

معمولی بیماریوں میں مبتلا افراد، جیسے سردي، کو ٹیکہ لگایا جاسکتا ہے۔ جو لوگ درمیانے یا شدید بیمار ہیں انہیں عام طور پر صحت یاب ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔

آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے۔

1. ویکسین کیوں لگوانیں؟

- نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین نیوموکوکل بیماری سے بچا سکتی ہے۔
- نیوموکوکل بیماری سے مراد نیوموکوکل بیکٹریا سے ہونے والی کوئی بھی بیماری ہے۔ یہ بیکٹریا کئی اقسام کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں:
- نمونیا (پھیپھڑوں میں انفیکشن)
- کان کے انفیکشنز
- سائنس کے انفیکشنز
- میننجائٹس (دماغ اور ریڑھ کی بڈی کو ڈھکنے والی بافت میں انفیکشن)
- بیکٹریمیا (دوران خون میں انفیکشن)

بر کوئی نیوموکوکل بیماری کا شکار بوسکتا ہے، لیکن چھوٹے بچے، بزرگ افراد اور مخصوص خطرے کے عوامل والے لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر نیوموکوکل انفیکشن بلکے بوتے ہیں۔ تابم، کچھ انفیکشن سے طویل مدتی مسائل پیدا بوسکتے ہیں، جیسے کہ دماغ کو نقصان یا سماعت کا ختم ہونا۔ نیوموکوکل بیماری سے ہونے والی میننجائٹس، بیکٹریمیا اور نمونیا موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔

2. نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین

نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین ان بیکٹریا سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے جو نیوموکوکل بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ نیوموکوکل کونجوگیٹ ویکسین (PCVs) کی کئی اقسام ہیں۔ کون سی مخصوص خوراکیں دی جائیں گی، یہ فرد کی عمر، ویکسین لگائے جائے کی سرگزشت اور طبی حالت پر منحصر ہے۔ آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گا کہ PCV کی کون سی ویکسین اور کتنی خوراکیں آپ کو لینی چاہیئں۔

▪ نوزائیدہ اور چھوٹی عمر کے بچوں کو عام طور پر PCV کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خوراکیں 2، 4، 6، اور 12-15 مہینے کی عمر میں تجویز کی جاتی ہیں۔

▪ کچھ مخصوص بڑی عمر کے بچے اور نو عمر افراد جنہیں بچپن میں یا نو عمری میں یہ خوراکیں نہیں دی گئی تھیں، انہیں بھی PCV ویکسین دینا ضروری ہے۔ یہ ان کی عمر اور طبی حالت یا دیگر خطرے والے عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔



**U.S. CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION**

National Vaccine Injury Compensation Program

National Vaccine Injury Compensation Program (نیشنل ویکسین انجری کمپنیشن پروگرام (VICP)) ایک وفاقی پروگرام ہے جو ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے تشكیل دیا گیا تھا جنہیں کچھ ویکسینوں سے ضرر پہنچا تھا۔ ویکسینیشن کی وجہ سے مبینہ چوٹ یا موت کے حوالے سے دعوے دائر کرنے کے لیے ایک وقت کی حد ہے، جو دو سال تک مختصر ہو سکتی ہے۔ پروگرام کے بارے میں جاننے اور دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں VICP کی ویب سائٹ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ملاحظہ فرمائیں یا 1-800-338-2382 پر کال کریں۔

7. میں مزید کیسے جان سکتا ہوں؟

- اپنے نگہداشتِ صحت فراہم کنندہ سے پوچھیں۔
- اپنے مقامی یا ریاستی محاکمه صحت کو کال کریں۔
- ویکسین پیکچ کی پرچی اور اضافی معلومات کے لیے Food and Drug Administration (فود اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) کی ویب سائٹ یہاں ملاحظہ کریں www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
- Centers for Disease Control and Prevention (بیماریوں کے کثروں اور روک تھام کے مراکز (CDC)) سے رابطہ کریں: کال کریں (1-800-232-4636) 1-800-CDC-INFO کی ویب سائٹ یہاں www.cdc.gov/vaccines ملاحظہ کریں۔

4. ویکسین کے رد عمل کے خطرات

▪ ویکسین لگانے کے بعد اس جگہ پر سرخی، سوجن، درد یا حساسیت، بخار، بھوک کی کمی، بے چینی (جڑچڑاں)، تہکن، سر درد، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد یا کپکپی جیسی علامات ظاہر ہوسکتی ہیں۔

PCV کو غیر فعال فلو ویکسین کے ساتھ ایک ہی وقت پر لگائے جانے پر چھوٹے بچوں میں بخار کی وجہ سے دماغی دورے پڑنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے مزید معلومات طلب کریں۔

لوگ بعض اوقات طبی طریقہ کار، شمول ویکسینیشن کے بعد بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں یا آپ کی بصارت میں تبدیلی آئی ہے یا کانوں میں گھٹیاں بج رہی ہیں تو اپنے فراہم کنندہ کو بتائیں۔

کسی بھی دوا کی طرح، ویکسین کی وجہ سے شدید الرجیاتی رد عمل، دیگر سنگین چوٹ لگنے، یا موت واقع ہونے کا بہت ہی شاذ امکان ہے۔

5. اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو تو کیا بوگا؟

ویکسین لگانے گئے شخص کے کلینک سے نکلنے کے بعد الرجی زا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شدید الرجی زا رد عمل کی علامات نظر آئیں (چھپاکی، چہرے اور گلے میں سوجن، سانس لینے میں دشواری، دل کی تیز دھڑکن، چکر آنا، یا کمزوری)، تو 1-800-822-7967 کو کال کریں اور اس شخص کو قریبی بسپتال لے جائیں۔

دیگر ایسی علامات، جو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہوں، کے لیے اپنے نگہداشتِ صحت فراہم کنندہ کو کال کریں۔

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ویکسین کے ناموفق واقعہ کے رپورٹنگ سسٹم) کو دی جانی چاہیے۔ آپ کا نگہداشتِ صحت فراہم کنندہ عام طور پر یہ رپورٹ درج کرائیں گا، یا آپ خود بھی کرا سکتے ہیں۔ VAERS کی ویب سائٹ یہاں www.vaers.hhs.gov کریں۔ VAERS صرف رد عمل کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اور VAERS کے عملے کے اراکین طبی مشورہ نہیں دیتے ہیں۔

